



- ۴- در صورتی که از داروهای ضدانعقادی (مثل آسپرین یا وارفارین) استفاده می‌نمایید حتما قبل از انجام جراحی، پزشک معالج خود را مطلع نمایید.
- ۵- در صورت وجود درد می‌توانید از مسکن‌هایی مثل استامینوفن یا بروفن استفاده نمایید.
- ۶- در صورتی که پانسمان شما افتاد با مرکز تماس گرفته و راهنمایی دریافت کنید.
- ۷- خوردن بستنی (۳ ساعت پس از جراحی) می‌تواند در کنترل خونریزی شما موثر باشد.
- ۸- از کشیدن سیگار اکیدا خودداری فرمایید.
- ۹- از خارج کردن بزاق (به علت ایجاد مکش و تشدید خونریزی) خودداری فرمایید.
- ۱۰- روی پانسمان را مسواک نزنید، مسواک و نخ زدن مناطقی که پانسمان ندارد را به طور معمول انجام دهید از دهانشویه کلرهگزیدین پس از مسواک زدن استفاده نمایید.
- ۱۱- داشتن فعالیت معمول اشکالی ندارد ولی از فعالیت‌های سنگین اجتناب نمایید.
- ۱۲- تورم معمولاً یک تا دو روز بعد از جراحی شروع شده و سه تا چهار روز بعد خاتمه می‌یابد، برای کنترل آن می‌توانید از حوله مرطوب گرم روی ناحیه استفاده نمایید. در صورت وجود تورم یا درد غیر معمول یا تب شدید با مرکز تماس گرفته، راهنمایی دریافت نمایید.



جراحی لثه:

از شایع‌ترین این جراحی‌ها می‌توان به جراحی افزایش طول تاج و جراحی به علت بیماری لثه اشاره نمود.

جراحی افزایش طول تاج:


زمانیکه طول تاج دندان به علت پوسیدگی یا شکستگی کوتاه شده باشد این جراحی ضرورت می‌یابد و این امکان را به بیمار می‌دهد که بتواند درمان پروتز یا ترمیم را انجام دهد.

جراحی لثه به علت بیماری لثه:

در این حالت لثه‌ها ملتهب شده و با کوچکترین عامل محرکی، مثل مسواک زدن دچار خونریزی می‌گردند. در این حالت دندانپزشک قسمت‌هایی از بافت لثه که دچار بیماری شده را برداشته تا از پیشرفت بیماری به استخوان زیرین جلوگیری شود.

مراقبت‌های پس از جراحی لثه:

- ۱- تا ۲۴ ساعت بعد از جراحی، از کمپرس سرد استفاده نمایید. (۵ دقیقه گذاشتن ۳ دقیقه برداشتن)
- ۲- تا ۳ ساعت از خوردن غذا پرهیز نمایید و تا ۲۴ ساعت از سمت دیگر برای خوردن استفاده نمایید.
- ۳- سعی کنید پانسمان صورتی رنگی که روی محل جراحی است تا زمان کشیدن بخیه (یک هفته تا ده روز) حفظ نمایید.



Dr.MONTAZERY SPECIALIZED DENTAL CLINIC

درمانگاه تخصصی دندانپزشکی

دکتر منتظری



بعد از درمان

قبل از درمان

پریو

(جراحی لثه)

۱۳- وجود خون در بزاق در ۴ تا ۵ ساعت اول پس از جراحی طبیعی بوده و خود بخود برطرف می گردد. اگر خونریزی قابل توجهی در ناحیه وجود دارد گاز استریل را به شکل U در آورده و آن را با انگشت شصت و اشاره خود در دوطرف پانسمان نگه داشته و ناحیه را به مدت ۲۰ دقیقه تحت فشار قرار دهید. اگر خونریزی بر طرف نشد با بخش تماس گرفته. راهنمایی دریافت نمایید.

۱۴- در صورتی که نوع جراحی شما افزایش طول تاج باشد، هر شش ماه برای معاینه آن مراجعه فرمایید و در صورتی که نوع جراحی شما حذف لثه بیمار بوده (فلپ) تا ۱ سال هر سه ماه و بعد از ۱ سال هر شش ماه مراجعه لازم است.

درمانگاه تخصصی دندانپزشکی دکتر منتظری

Dr.MONTAZERY SPECIALIZED DENTAL CLINIC



مطهری، جنب متروی مفتوح، روبروی خیابان میر عماد ساختمان ۳۱۲، طبقه اول

Dr montazeri 2000@gmail.com

۸۸۳۲۱۶۹۸-۸۸۳۲۰۴۶۸-۸۸۳۲۰۳۸۴

